

Date de mise à jour : 12 juin 2021

Agrocybe cylindracea (de Candolle: Fr.) R. Maire



Ordre : Cortinariales (Basidiomycètes)

Synonyme(s) : *Agrocybe aegerita*, *Cyclocybe cylindracea*

Nom(s) commun(s) : Pholiote du peuplier

Nom(s) vernaculaire(s) : Pivoulade

Ecologie : Lignicole, pousse en touffe sur les troncs d'arbre (surtout les peupliers, mais aussi les saules, ormes)

Répartition : Peu commun, plus présent dans le sud de la France

Description :

- **Chapeau** : 3-12cm de diamètre, plutôt lisse, peut être parfois craquelé, de couleur **brun foncé** chez les spécimens jeunes puis **s'éclaircissant en vieillissant pour devenir blanc-gris**. Le centre du chapeau reste toujours d'aspect plus foncé.
- **Stipe** : blanc, présence d'un anneau ample membraneux assez haut sur le stipe
- **Hyménophore** : lames légèrement décurrentes blanches, puis de couleur crème-brun en vieillissant
- **Chair** : de couleur blanche crémeuse

Microscopie : Sporée brun chocolat ; spores elliptiques, petit pore germinatif

Odeur : Plutôt fruitée ou de lait caillé quand le spécimen est jeune, puis odeur de vieux vin quand celui-ci est plus vieillissant

Saveur : Agréable

Confusion :

- *Agrocybe rivulosa* : assez rare, odeur farineuse, pousse plutôt sur de la paille, fumiers. On peut le retrouver dans les prairies également

Comestibilité : Comestible

Références :



Marcel BON. Champignons de France et d'Europe Occidentale. Flammarion, 2012.

Guillaume EYSSARTIER et Pierre ROUX. Le guide des champignons - France et Europe. Belin: , 2017.

Crédit photo : Strobilomyces, 2012, CC-BY-SA

