

Date de mise à jour : 12 juin 2021

Clathrus ruber Micheli : Pers.



Ordre : Phallales (Basidiomycètes)

Nom(s) commun(s) : Clathre rouge

Nom(s) vernaculaire(s) : Clathre grillagé, Cœur de sorcières

Forme générale : Forme d'œuf

Ecologie : Pousse dans les bois de conifères ou de feuillus. Champignon solitaire ou par petits groupes

Répartition : Régions méridionales, surtout méditerranéennes

Description :

- **Chapeau** : absence de chapeau
- D'abord sous forme d'œuf blanc de 4-5 cm de hauteur, gélatineux avec un ou plusieurs cordons mycéliens, puis libère un "grillage" de couleur rouge avec une face interne en partie recouverte d'une substance visqueuse de couleur vert-noirâtre (gléba)
- **Stipe** : absent
- **Hyménophore** : gléba de couleur vert sale
- **Chair** : fragile, cassante, gélatineuse

Microscopie : Spores ± cylindriques, lisses et nombreuses

Odeur : Forte odeur désagréable, de cadavre

Saveur : Dans l'œuf, saveur de radis

Confusion : Aucune confusion possible sauf à l'état juvénile (lorsqu'il a encore qu'une forme d'œuf), avec le Clathre d'Archer et le Satyre puant (*Phallus impudicus*)

Comestibilité : Sans intérêt

Remarque particulière : Ce champignon n'a ni lames, ni anneau

Références :



Marcel BON. Champignons de France et d'Europe Occidentale. Ed. Flammarion, 2012

Guillaume EYSSARTIER, Pierre ROUX. Le guide des champignons - France et Europe. Ed. Belin, 2017

Yves François POUCHUS. Guide de poche de mycologie officinale. Ed. Méd. Sciences Publications - Lavoisier, 2012

Crédit photo :Siga, 2018, CC-BY-SA

