Lycoperdon echinatum Pers.: Pers.

Ordre: Lycoperdales (Basidiomycètes)

Nom(s) commun(s): Vesse de loup hérisson, Vesse de loup épineuse

Forme générale : Sphère surmontée d'un pied

Ecologie: Sous feuillus (surtout chênes, châtaigniers, hêtres)

Répartition : Peu commun

Description:

Chapeau : en massue, beige à brun, recouvert de longs aiguillons bruns (aspect de "bogue de châtaigne"), labiles, laissant apparaître une deuxième membrane (endopéridium) brun-grisâtre, réticulée (cicatrice des aiguillons après leur chute). A maturité, un petit trou central s'ouvre au sommet pour libérer les spores

- Stipe : court, conique, beige ochracé, avec des aiguillons plus courts

- Chair: (gléba) blanche puis jaune-brun olivâtre

Microscopie : Spores globuleuses, nettement verruqueuses ; sporée brun chocolat

Odeur : Spécifique de Bolet

Saveur : Douce

Confusion : - Vesse de loup noircissante (*Lycoperdon nigrescens*) : aiguillons courts et bruns puis noircissant, dégage une odeur désagréable, pousse sous conifères, sur sols acides, non comestible

Comestibilité : Sans intérêt culinaire

Références :

Marcel BON. Champignons de France et d'Europe Occidentale. Ed. Flammarion, 2012, 368p.

Didier BORGARINO, Christian HURTADO. Le guide des champignons. Ed. Edisud, 2011, 450p.

Régis COURTECUISSE, Bernard DUHEM. Guide des Champignons de France et d'Europe. Ed. Delachaux et Niestle, 2013, 544p.

Guillaume EYSSARTIER, Pierre ROUX. Le guide des champignons, France et Europe. Ed. Belin:, 2017, 1152p.

Cécile LEMOINE, Guillaume EYSSARTIER. Le grand guide des champignons. Ed. Ouest-France, 2018

<u>Till-Reinhard LOHMEYERD, Ute KUNKELE. Champignons : Plus de 600 fiches d'identification.</u> <u>Ed. L'imprévu, 2016</u>

<u>Yves François POUCHUS. Guide de poche de mycologie officinale. Ed. Méd. Sciences-Lavoisier, 2012, 78p.</u>

Crédit photo: François, Marie-Geneviève Poillotte (Soc. Myco. Châtillon), 2002, CC-BY-NC-SA





